






W. Zn-Mn



**ZINC Y MANGANESO DE ALTA EFICACIA.
PARA APLICACIÓN FOLIAR Y RADICULAR.**



Nutrición Sistémica por Excelencia ...

Abono nacional. Mezcla líquida con micronutrientes complejados. W. Zn-Mn es un producto líquido con zinc y manganeso complejados con LIGNOSULFONATOS para garantizar una rápida y completa asimilación.

Los lignosulfonatos son un agente complejante que permiten que el zinc y el manganeso sean absorbidos por la planta y distribuidos dentro de la misma con mayor facilidad, evitando posibles bloqueos de estos nutrientes en el suelo.

Las carencias de zinc y manganeso, suelen presentarse casi siempre de manera conjunta, por lo que W. Zn-Mn está especialmente formulado e indicado para corregir dichas carencias.

El producto está formulado con Tecnología TMR, la que proporciona un efecto sinérgico, sistémico, adaptogénico y sobre todo **duradero en el tiempo (remanencia)**.



MODO DE EMPLEO

Foliar, fertirrigación, Pivot, cobertura y en inyección directa.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

	P/P	P/V
Manganeso (Mn) soluble en agua	7,1%	10%
Manganeso (Mn) complejo por LS	7,1%	10%
Zinc (Zn) soluble en agua	7,1%	10%
Zinc (Zn) complejo por LS	7,1%	10%

Agente complejante: Lignosulfonatos.
Contiene aniones acetato y nitrato

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Producto líquido. Concentrado soluble (SL).

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción complejada: pH entre 3 y 9.

Solubilidad total. Densidad: 1,4 kg/L. pH: 2,5-3



DEFICIENCIA DE ZINC EN CÍTRICOS



DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Vía Foliar: De 150 a 200 ml/100 L de agua.

Vía Radicular: De 2 a 3 L/Ha y aplicación.

Vía Inyección directa: De 10 a 12 ml/m³ de agua.

W.Zn-Mn puede ser aplicado vía radicular mediante cualquier sistema de riego. Aplicar en los momentos de mayor crecimiento vegetativo (primavera y final de verano), o en los momentos en que la planta presente deficiencias de estos nutrientes.

Cuando es aplicado foliarmente, además de corregir rápidamente las necesidades o carencias de Zinc y Manganeso, **tiene una acción sistémica, persistente y duradera: entre 40 y 60 días después de su aplicación.**

Aplicar dos tratamientos a dosis máxima en estados carenciales y dosis mínimas cuando los análisis foliares indiquen necesidad de mantener niveles foliares adecuados.



DEFICIENCIA DE MANGANESO EN CÍTRICOS



A LA VENTA EN ENVASES DE 1, 5 Y 20 LITROS



CONTENIDO NETO
1L/1,4kg
5L/7kg
20L/28kg

AgroSerna s.l.

Pol. Ind. Mos del Bou, P-14, nº 58
Apartado de correos 147,
03340 ALBATERA (Alicante) España
Tlf. +34 965 487 864 Fax. +34 956 487 866

info@agroserna.es

www.agroserna.com



FABRICADO EN ESPAÑA