









W. NABRAKINT



SUSTANCIA BÁSICA
PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN



Nutrición Sistémica por Excelencia ...

El **W. NABRAKINT** es un biopolímero de aminopolsacaridos que está compuesto por D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina siendo la D-glucosamina un derivado de la quitina obtenida de **Exoesqueleto de Crustáceos** marinos (cangrejos, gambas, langostas, etc.) y también de insectos y también en otras fuentes naturales de algas, levaduras y protozoos.

W. NABRAKINT, es un potente inductor de la resistencia sistémica adquirida frente al ataque de insectos y enfermedades. Cuando las células vegetales están en presencia de **W. NABRAKINT**, estas crea un bio-film alrededor del tejido vegetal que previene el ataque de enfermedades a la vez que induce la síntesis de compuestos fungiestáticos y nemoestáticos.



Cuando las plantas son tratadas con **W. NABRAKINT** desencadenan unos cambios bioquímicos y estructurales que llegan a producir unos incrementos notables en los aumentos de las producciones medias ya que toleran y soportan los diferentes estrés hídricos y térmicos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

	P/P
Quitosano purificado (Solución neutralizada en HCl)	3%

SUSTANCIA BÁSICA: Reglamento de ejecución N°1116/2015 de la Comisión. Se puede usar con arreglo a las condiciones especificadas en el informe SANCO/12388/2013 por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

pH: 3

Densidad: 1,05



ADVERTENCIAS:

Utilícese según buenas prácticas de salud e higiene.
P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
USO BAJO ASESORAMIENTO TECNICO-AGRONOMICO.
Almacenar a una temperatura entre +3-4° C y +36° C.
Mantener en un lugar seco.
En caso de derrame accidental, absorber con tierra y retirar.



FABRICADO EN ESPAÑA

AgroSerna s.l.

Pol. Ind. Mos del Bou, P-14, nº 58
Apartado de correos 147,
03340 ALBATERA (Alicante) España
Tlf. +34 965 487 864 Fax. +34 956 487 866

info@agroserna.es

www.agroserna.com



DOSIS Y MODO DE EMPLEO EN FERTIRRIGACION:

Las dosis a usar serán de: 2,5-3 l/Ha. y aplicación.

Realizar aportaciones frecuenciales "quincenales" mediante fertirrigación cada dos semanas desde el trasplante, hasta completar 12-15 l/Ha. y ciclo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO EN PULVERIZACION:

Las dosis para pulverización foliar oscilarán entre: 200-250 cc/hl.

NOTA:

El pH del agua deberá oscilar entre: 6,5 y 7,5.
Solubilidad total.

A LA VENTA EN ENVASES DE 1 Y 5 LITROS



CONTENIDO NETO
1L/1,05kg
5L/5,25kg