

W. BOVERMETH



NUTRIENTE BIOLÓGICO EN FORMA DE LÍQUIDO SOLUBLE
CON TECNOLOGÍA CCEON^(MS).
RECOMENDADO PARA TRATAMIENTOS INTEGRALES Y BIOLÓGICOS.



Nutrición Sistémica por Excelencia ...

W. BOVERMETH es una fórmula natural a base de un preparado orgánico - biológico que engloba en su formulación nutrientes biológicos obtenidos por fermentación aeróbica que permite a los vegetales adquirir resistencias ante situaciones adversas o no deseadas. Estas resistencias actúan transmitiendo órganos de defensa naturales. Debido a su modo de

acción y efectos reales, las plantas adquieren salubridad visual a los 5 u 8 días de ser aplicado el producto. Éste tipo de formulado no genera ningún residuo ni resistencias, por lo que no tiene plazo de seguridad, pudiéndose emplear en momentos muy próximos a la recolección. Este formulado respeta y es compatible con gran parte de la fauna beneficiosa.



RIQUEZAS GARANTIZADAS

	P/P
Extracto de enzimas y metabolitos	23,5 %
E. Minerales	1,85 %
Melazas	24,7 %
Agua	50 %

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Producto elaborado a través de un proceso de fermentación aerobia que tiene como ingredientes activos: Melazas de remolacha, sacarosa común, levadura panadera, enmiendas minerales y solución de micronutrientes.

Producto líquido soluble.

Densidad: 1,15-1,20 kg/L.

pH: 5 - 5,5



INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN:

DOSIS: Para temperaturas entre 15 y 25 °C, la dosis de W. BOVERMETH serán de 3 a 4 l/ha o 300-400 ml/hl asegurando una cobertura mojada TOTAL.

Para temperaturas entre 26 y 36 °C, la dosis de W. BOVERMETH serán de 4-5l/ha o 400-500 ml/hl asegurando una cobertura de mojada TOTAL.

Momento de aplicación:

Los tratamientos deben efectuarse cuando se detecten las condiciones adversas o propicias. La frecuencia de aplicación será entre 7 y 10/12 días. Mientras que las aplicaciones preventivas podrían tener una frecuencia de hasta 15 días entre tratamientos.

Especialmente en verano, con altas temperaturas en días despejados (26 a 36 °C) es necesario utilizar la frecuencia de aplicaciones más corta (7-8 o 10 días) y aumentar la dosis de los tratamientos a 4/5 l/ha. Temperaturas moderadas (15 a 25 °C) en épocas lluviosas o de importante humedad relativa, son idóneas para el desarrollo de estos hongos, por lo que no se requiere recurrir a tratamientos tan continuos, pueden ser cada 15 días, y las dosis pueden bajar a 3l/ha.

Modo de aplicación:

Se aplica mediante pulverización foliar a baja presión mojando bien el cultivo e iniciando el tratamiento con las primeras condiciones adversas repitiendo cada 7-10 días en caso de necesidad.

*OBSERVACIONES: Se recomienda emplear W. SUPREM para proteger de la radiación solar, así como aplicar en las horas finales de la tarde al anochecer.

NOTA: Es aconsejable que el agua para pulverizar no contenga restos de fungicidas químicos (Sulfato de Cobre, Permanganato).



FABRICADO EN ESPAÑA

AgroSerna s.l.

Pol. Ind. Mos del Bou, P-14, nº 58
Apartado de correos 147,
03340 ALBATERA (Alicante) España
Tlf. +34 965 487 864 Fax. +34 956 487 866

info@agroserna.es

www.agroserna.com

A LA VENTA EN
ENVASES DE 1 Y
5 LITROS.



CONTENIDO NETO
1L/1,15kg
5L/5,75kg